



من المرجح أن تصاب بفيروس COVID-19 مرة أخرى

الحقيقة:

الأشخاص غير المحصنين/المطعمين الذين أصيبوا بالفعل بـ
COVID-19 هم أكثر عرضة مرتين للإصابة بـ COVID-19 مرة
أخرى من الأشخاص المحصنين/المطعمين بالكامل¹



كان لدي COVID-19، لذلك لدي مناعة ضد الفيروس


في الواقع:

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها
[Centers for Disease Control and Prevention, CDC]
بالانتظار 90 يوماً للحصول على لقاح COVID-19 بعد
• علاج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة أو علاج COVID-19 بالبلازما، أو
• تشخيص متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS - A أو MIS - C)
تحدث إلى طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية لمعرفة المزيد

حقائق حول اللقاح



لا تزال بحاجة إلى لقاح COVID-19



تم تمويل إعداد هذا المورد من خلال المنحة #90DDUC0036-05-00 من
U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Community Living, Administration on Intellectual and Developmental Disabilities
ديسمبر 2021.

المصادر:

Cavanaugh, A.M., Spicer, K.B., Thoroughman, D., Glick, C., & Winter K. (2021, August 13).
Reduced Risk of Reinfection with SARS-CoV-2 After COVID-19 Vaccination — Kentucky
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). 2021. مايو-يونيو 2021. 2021;70:1081-1083
تم الاسترجاع من: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7032e1>. (21 ريوكتاً 2021) U.S. Department of Health & Human Services
Frequently Asked Questions about COVID-19. Vaccination. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html>

تم تطويره بواسطة The Boggs Center on Developmental Disabilities, Rutgers Robert Wood Johnson Medical School
335 George Street, New Brunswick, NJ 08901 • rwjms.rutgers.edu/boggscenter • 732-235-9300